

KAZUISTYKA KLINICZNA

WIESŁAWA JETHON, JERZY JETHON
Łabiszyn

OPERACYJNE USUNIĘCIE CZOPA OKRĘŻNICY W PRZEPUKLINIE MOSZNOWEJ U ŻREBAKA

Dnia 21.VI.1974 r. zgłoszono 7 miesięcznego żrebaka (ogiera) z objawami silnych bólów kolkowych. Stwierdzono przepuklinę mosznową z zawartością jelit, w których znajdował się czop wielkości dwóch pięści. Podjęto leczenie operacyjne. Wykonano premedykację i miejscowe znieczulenie zachowując przytomność zwierzęcia. Po przecięciu worka mosznowego okazało się, że w worku przepuklinowym znajduje się lewy dolny pokład okrężnicy dużej. Przesunięcie czopa okazało się niemożliwe ze względu na małe wrota przepuklinowe. Wykonano cięcie okrężnicy — przeprowadzono je równoległe do jej przebiegu aby uniknąć ewentualnego późniejszego zwężenia światła tego odcinka jelita.

Po usunięciu czopa nastąpił wzmożony ruch perystaltyczny jelit, który spowodował wydostawanie się na zewnątrz przez otwór w okrężnicy nagromadzonych w dużej ilości płynów i gazów z przedniego odcinka przewodu pokarmowego. To poniekąd samoczynne opróżnianie jelit trwało około 20 minut. Po upływie tego czasu zeszyto okrężnicę dwupiętrowo szwem Lamberta. Zamknięcie wrót przepuklinowych jak i zeszycie rany pooperacyjnej wykonano według ogólnie przyjętych zasad. Po zabiegu operacyjnym podano osłonę antybiotykową. Ze względu na karmienie zwierzęcia mlekiem matki leczenie pooperacyjne odbywało się u właściciela. Przebieg był bez powikłań i nastąpiło w czasie 4 tygodni pełne wyleczenie.

Adres autora: lek. wet. Wiesława Jethon, ul. Barcińska 4, 89-210 Łabiszyn, pow. Szubin.


STANISŁAW LACHOWICZ,
ANDRZEJ MODRAKOWSKI

NIEZWYKŁY PRZYPADEK ZŁAMANIA KOŚCI UDOWEJ KONIA

Z Kliniki Chirurgicznej Instytutu Patologii i Terapii
Zwierząt Wydziału Weterynaryjnego AR we Wrocławiu


Przedstawiony przypadek dotyczący rocznego żrebaka pełnej krwi jest ciekawy ze względu na to, że objawy pozorowały zwichnięcie rzepki ku górze. Do takiego rozpoznania mogłaby skłaniać zmieniona postawa kończyny, wyprostowany staw kolanowy i skokowy oraz zgięty palec. Drugim charakterystycznym objawem przypominającym zwichnięcie rzepki był zupełny brak ruchomości w stawie kolanowym. Nawet najbardziej wyteżone próby zgięcia tego stawu pozostawały bez wyniku. Podczas poruszania się zwierzę chwilami opierało kończynę krawędzią ściany przedniej kopyta przy wyprostowanym i nieruchomym stawie kolanowym. Ostateczne rozpoznanie ustalono na podstawie badania radiologicznego. Ze względu na bardziej dogodne warunki postanowiono przeprowadzić badanie na zwierzęciu leżącym. Konia położono sposobem farmakologicznym wykorzystując do tego celu działanie eteru gwajakolowego gliceryny

„Gwajamar”. Takie postępowanie zapewniło prawidłowe umiejscowienie kasety oraz wykluczyło możliwość poruszenia kończyny podczas wykonywania zdjęcia. Badanie radiograficzne przeprowadzono przy pomocy przenośnego samoprostującego aparatu rtg. Warunki ekspozycji: 15 mA, 9 sek., odległość lampa — kaseeta 80 cm.



Ryc. 1. Złamanie kości udowej konia

Wynik badania radiologicznego: rentgenogram wykazuje podłużno-skośne złamanie części dalszej trzonu kości udowej z nasunięciem odłamów. Przemieszczony odłamek znajduje się w zgiętej, tylnej okolicy stawu kolanowego, co wyjaśniło niemożność zginania tego stawu i zarazem objawy pozorujące zwichnięcie rzepki. W tym układzie odłamów widoczna jest szeroka szpara złamania (ryc. 1).



Ryc. 2. Szkic rentgenogramu

Na tle opisanego przypadku ustalenie rozpoznania wymaga omówienia. Złamania kości udowej koni mogą dotyczyć zarówno nasady bliższej i szyjki oraz trzonu lub krętarza jak i nasady dalszej. Rozpoznawanie utrudnia umięśnienie uda i szybko zjawiający się po złamaniu obrzęk tkanek miękkich. Obrzęk, zwłaszcza po upływie pewnego czasu, stanowi przeszkodę w wykrywaniu charakterystycznych dla złamania trzeszczeń. Badanie radiologiczne tej okolicy ciała zwierząt dużych jest także trudne. Odnosi się to przede wszystkim do części bliższej kości udowej, gdzie ze względów technicznych wogóle nie daje się go przeprowadzić. Złamania przynasadowe kości udowej w stawie kolanowym mogą u koni pozorować zwichnięcie rzepki